

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL : 120 F Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON



80.22.19.38

ÉDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 18 - 25 juin 1986

COLZA

Alternaria : à surveiller en situations tardives

TOURNESOL

Pucerons : insecticides déconseillés

POIS

Traitement fongicide : si présence de Botrytis

Traitement insecticide : inutile

CULTURES LEGUMIERES

Pomme-de-terre : protection contre Mildiou et Doryphores

MAIS

Stades : très variables suivant les dates de semis
de 5 feuilles (20 cm) à 12 feuilles (80 cm).

PUCERONS

En général absence de pucerons, quelques parcelles présentent cependant de très faibles infestations. Aucune intervention n'est justifiée.

PYRALE

Encore aucune capture enregistrée à ce jour, le début du vol est prévu pour la fin de semaine (28-29 juin).

COLZA

ALTERNARIA

La présence de cette maladie sur siliques reste limitée à quelques parcelles, le plus souvent non traitées en mai.

La période limite d'intervention : - est atteinte dans les situations en avance
- se situera du 7 au 15 juillet environ dans les situations tardives selon les conditions météorologiques à venir.

TOURNESOL

De nombreuses parcelles sont au stade "bouton étoilé".
Le rythme rapide d'évolution de la végétation se maintient.

PUCERONS

Les populations de pucerons verts du prunier régressent ou stagnent à des niveaux très faibles (inférieurs à 5 pucerons/plante). Toute intervention insecticide est déconseillée.

P.167

POIS

MALADIES

SITUATION :

Peu d'évolution par rapport à la semaine dernière.

Les symptômes d'Anthracnose restent localisés aux feuilles basses.

Présence de Botrytis, qui se développe à partir des anciens pétales (mais les conditions météorologiques actuelles lui sont défavorables).

Selon les parcelles, présence de Mildiou.

PRECONISATION :

Dans les situations tardives proches de la fin floraison, intervenir si présence de Botrytis.

RAVAGEURS

Ne pas envisager de traitement insecticide.

CULTURES LEGUMIERES

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Des contaminations ont pu se produire au cours de la semaine dernière notamment à la suite des orages. Aucun foyer n'a été signalé jusqu'à présent.

Malgré les fortes températures enregistrées actuellement, il est nécessaire de ne pas négliger la protection.

DORYPHORES

Des larves de Doryphores sont présentes dans de nombreuses parcelles. Effectuer des traitements dès qu'elles atteignent la taille d'un grain de blé.

PUCERONS TOUTES CULTURES

Surveiller les pucerons, des pullulations importantes étant observées actuellement. Traiter à l'apparition des premières colonies en tenant compte des délais d'emploi avant récolte.

*

*

*